



Contenido	Art. N°.	U/E
Botella 1 litro	6017 201 002	1

Composición	Alfa-Cipermetrina 8%, d-Tetrametrina 2% Butóxido de Piperonilo 10% Piriproxifén 1% Alcohol isopropílico, otros disolventes y excipientes, csp. 100%
Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Color	Amarillo claro
Registro ROPZ	01663-P
Caducidad	36 meses

Actividad:

Elevada eficacia frente a todo tipo de insectos: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas, etc, en todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero y zoonosanitario.

Modo de empleo:

Antes de usar leer detenidamente la etiqueta.
Aplicación por pulverización del producto diluido en agua.
Pulverizar las superficies a tratar con la emulsión a razón de 1 litro de emulsión para 20 m². En el caso de superficies porosas, se recomienda aplicar a razón de 1 litro de emulsión para 10 m².
Los tratamientos de mantenimiento a la dosis de 0,2% pueden efectuarse en presencia de animales, evitando la aplicación directa del producto sobre los mismos.
Los tratamientos a dosis superiores se efectuarán en ausencia de animales, debiendo respetarse un Plazo de Seguridad de 12 horas, antes de hacer uso de los locales.
Ventilar adecuadamente el recinto.
No deberá mezclarse con otros productos.

Dosis:

Mantenimiento: 0,2% en emulsión acuosa (20 ml en 10 litros de agua).

Infestaciones moderadas: 0,3-0,5% en emulsión acuosa (30-50 ml en 10 litros de agua).

Fuertes infestaciones (Tratamiento de choque): 1% en emulsión acuosa (100 ml en 10 litros de agua).

Preparación de la emulsión: Adicionar la cantidad adecuada de producto sobre una parte de agua (unas 10 veces la cantidad de producto), agitar para favorecer la emulsión, añadir el agua restante y agitar de nuevo.

Lampo Inacol-W IGR

**Insecticida, acaricida, ovicida,
larvicida con efecto remanente
de uso exclusivo en granjas
(ámbito zoonosanitario)**

- Insecticida polivalente con presencia de hormona IGR de última generación.

Ventajas:

- Acción polivalente de amplio espectro.
- Actividad ovicida (huevos) y larvicida (larvas).
- Acción repelente.
- Efecto remanente.

- Producto en forma de líquido concentrado autoemulsionable, a base de una combinación de Alfa-Cipermetrina y D-Tetrametrina, sinergizada mediante PBO, y adicionada de Piriproxifén (IGR), en un medio orgánico anhidro.

Ventajas:

- Acción contra todo tipo de insectos: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas, etc. en todo tipo de instalaciones

- Contiene Alfa-Cipermetrina.

Ventajas:

- Efecto letal para las plagas sobre las que actúa.
- Mayor actividad y estabilidad a la presencia de luz en comparación a las piretrinas naturales.
- Presenta efecto remanente (duradero en el tiempo).
- Conserva un bajo efecto residual y baja toxicidad para mamíferos propio de todos los piretroides.

- Contiene D-Tetrametrina, sinergizada con PBO.

Ventajas:

- D-Tetrametrina presenta efecto de choque (efecto inmediato).
- PBO refuerza y potencia el efecto de choque y actúa como repelente.

- Contiene hormona reguladora de crecimiento Piriproxifén (IGR).

Ventajas:

- Efecto ovicida, impide la eclosión de los huevos, y larvicida, actúa frente a las larvas.

- Contiene agente filmógeno, formador de film.

Ventajas:

- Efecto remanente, forma una fina película adherente sobre las zonas tratadas.

- A la dosis del 0'2% es aplicable en presencia de animales.

Ventajas:

- A diferencia de otros insecticidas de mercado y SÓLO a la dosis del 0'2% (20 ml/10 litros de agua) NO PRECISA DE PLAZO DE SEGURIDAD.

- No se degrada con el agua.

Ventajas:

- Diferencia versus insecticidas organofosforados que se hidrolizan en medio acuoso.

- Componentes fotoestables.

Ventajas:

- Gran persistencia del producto, potenciado por la presencia del agente generador de film.